

# A vacina HPV é recomendada para pré-adolescentes e adolescentes entre 11 e 12 anos para proteger contra o câncer causado pela infecção do HPV

Por que minha filha ou meu filho necessita tomar a vacina do HPV?

A vacina do Human Papillomavirus (HPV) protege do câncer causado pela infecção do HPV. HPV é um vírus comum que atinge adolescentes e adultos. Aproximadamente 14 milhões de pessoas, incluindo adolescentes, são infectadas pelo HPV a cada ano. A infecção pelo HPV pode causar câncer cervical, vaginal e vulvar em mulheres e câncer de pênis em homens. Também pode causar câncer no anus, na parte traseira da garganta e um crescimento ou alteração nas partes genitais de mulheres e de homens

Quando devo vacinar a minha filha ou meu filho?

Todas as crianças com idades entre 11 e 12 anos devem tomar duas vacinas do HPV, sendo que a segunda deveria ser tomada de seis a doze meses depois da primeira vacina. Vacinar na hora certa protege os pré-adolescentes antes mesmo de serem expostos ao vírus. O vírus do HPV é transmitido durante o ato sexual. Algumas crianças podem precisar de até três doses da vacina do HPV. Por exemplo, adolescentes que são vacinados com menos de cinco meses entre uma dose e outra irão precisar de uma terceira dose para uma proteção mais efetiva. Além disso, crianças que começam as séries de vacinas nos seus 15 anos ou depois irão precisar de três doses dadas a cada seis meses. Se o seu adolescente ou a sua adolescente não fez a vacina ainda, fale com o médico deles sobre fazer a vacina o mais rápido possível. A melhor maneira de lembrar todas as doses da vacina para o/a seu/sua filho/filha é já deixar marcadas as datas das doses que faltam antes mesmo de você sair da clínica.

A vacina do HPV é segura para o meu filho/a?

A vacina do HPV oportuniza uma proteção efetiva, segura e duradoura contra cânceres causados pelo vírus. Esta vacina já tem aproximadamente 10 anos de pesquisa e monitoramento. Assim como qualquer outra vacina ou remédio, a vacina do HPV pode causar efeitos colaterais. A maioria deles são leves e incluem dor ou inchaço no braço onde a vacina foi aplicada, tontura, desmaio, náusea e dor de cabeça. Desmaios após qualquer vacina, incluindo a do HPV, são mais comuns entre adolescentes. Para prevenir desmaios ou machucados devido aos desmaios, os adolescentes devem estar

sentados ou deitados durante a vacina e permanecerem nesta posição por mais 15 minutos depois que a vacina foi dada. Os benefícios da vacinação do HPV são muito maiores do que os riscos que os efeitos colaterais representam. É importante falar ao médico ou a enfermeira se o seu filho ou sua filha tem alguma alergia severa incluindo alergia a latex ou a algum fungo. A vacina do HPV não é recomendada em casos de gravidez.

Como eu posso conseguir ajuda para pagar estas vacinas?

O programa Vaccines for Children (VFC) proporciona vacinas para crianças de até 18 anos que não possuem seguro de saúde, que qualificam para o Medicaid, American Indian ou nativos do Alasca. Saiba mais através do site [www.cdc.gov/Features/VFCprogram](http://www.cdc.gov/Features/VFCprogram)

Como posso saber mais?

Fale com o médico ou enfermeira do seu filho ou da sua filha para saber mais sobre a vacina do HPV ou sobre outras vacinas que o seu filho precise. Você pode se informar mais sobre a vacina do HPV através do site:

[www.cdc.gov/hpv](http://www.cdc.gov/hpv)